

RELATORIO

Á CERCA DO

ESTADO DA CULTURA DAS ARVORES DE QUINA

DE

ILHA DE SANTO ANTÃO

ANALYSE CHIMICA DAS MESMAS QUINAS



LISBOA

IMPRENSA NACIONAL

1887

K14839


L. xvi Qui



22102382373

Med

K14839



Digitized by the Internet Archive
in 2016

<https://archive.org/details/b28055688>

RELATÓRIO

ACERCA DO

ESTADO DA CULTURA DAS ARVORES DE QUINA

DA

ILHA DE SANTO ANTÃO

ANALYSE CHIMICA DAS MESMAS QUINAS



LISBOA

IMPRESA NACIONAL

1888

22755307

WELLS INSTITUTE LIBRARY	
Call	weMOmec
No.	OV

RELATORIO

III.^{mo} sr.—Enearregado por s. ex.^a o governador geral de visitar as arvores que dão quina, existentes em Santo Antão e de apresentar o meio de dar inereamento a uma cultura de tão risonho futuro para esta provincia, venho dar conta do serviço que me foi commettido.

Por inutil deixo de fazer a historia da introdução das primeiras plantas de quina em Santo Antão, porque as noticias officiaes publicadas pelos facultativos Hopffer e Custodio Duarte d'isso me dispensam. Devo, ainda assim, lembrar os esforços empregados por elles e o desvelado cuidado que ao governador Albuquerque mereceu tão importante aequisição.

Decorreram já dez annos depois que as primeiras quarenta plantas foram transportadas para Santo Antão e não obstante o convidativo resultado obtido, hoje apenas se conta 262 individuos!!

E na parte mais elevada da ribeira do Paul, nas propriedades dos srs. Jansenio Mello, Augusto Nobre e Simão Anahory onde se encontra maior numero de quinas e em estado mais floreseente.

Na Ribeira Grande, sitio «João Affonso», existem 9 plantas nas fazendas dos srs. Luiz Pedro de Lima, Eliseu e Nieolan de Araujo, indicando por seu poueo desenvolvimento o abandono em que têm estado.

A altitude dos pontos mencionados não é inferior a 800 metros; digo isto por estimativa, porque fui enearregado d'este serviço estando em Santo Antão em visita á delegação de saude, portanto não tendo á minha disposição um barometro que me auxiliasse na medição, como era necessario.

Na ribeira do Paul, a região que se estende desde o campo do Cão até Igrejinha, medindo 7 kilometros de comprimento sobre 3 de largo, no principio da ribeira denominada «Cabo da Ribeira», antolha-se-me apropriada á cultura das quinas, assim como as partes mais elevadas das ribeiras de João Affonso e Pico.

É possível que nas ribeiras das Patas, Altomira, etc., haja pontos aproveitáveis, mas não os visitei. Póde-se portanto calcular, e sem risco de ser taxado de exagerado, que na ilha de Santo Antão ha possibilidade de elevar a cifra das arvores de quina a centenas de milhares, se o terreno hoje occupado pelo cafeseiro o for pela nova cultura. Não se trata com isto a produção do café; dá-se perfeitamente nas zonas cobertas de canna saccharina.

As qualidades existentes são cinchonas succirubras e calisaya. Algumas das primeiras é das mais antigas medem já 11 metros de altura o 70 centímetros de circunferencia, enquanto que as calisayas attingem 8 pés de altura.

Não merece menção, senão para ser condemnado, o modo de cultura das quinas em Santo Antão; porém isto mesmo mostra á evidencia que encontram na temperatura amena, no ar humido e sufficiente altitude dos terrenos d'aquella ilha as condições proprias de existencia. As plantas vindas de Lisboa foram postas no meio de cafesciros e creadas por ramos de arvores como meio de abrigo enquanto novas; logo que adquiriram um certo desenvolvimento ficaram entregues a si mesmas, sem adubo, regas ou quaesquer outros cuidados da parte dos lavradores, e ainda hoje não se emprega outro processo.

É por isso que não ha nenhum trato de terreno occupado simplesmente pelas quinas; existem disseminadas no meio dos cafesciros, asphyxiadas por estes, e n'isto está a razão, a meu ver, da desproporção que se nota entre a altura e o diametro d'ellas.

Para os filhos de Santo Antão as cinchonas eram arvores de luxo e nada mais, porque, desconhecendo o seu valor commercial e modo de exploração, toleravam que occupassem modestissimo logar no meio de plantações suas conhecidas.

E nada admira. Sem educação agricola, sem o incentivo do um lucro certo, sem pessoa idonea encarregada de uma cultura especial n'esta provincia, exigindo pratica e conhecimento scientificos, não admira, digo, que as plantas entregues aos lavradores de Santo Antão tenham dado tão poucos herdeiros.

Se em Java, India ingleza, e ultimamente na illha da Reunião se contam as quinas por milhões, é porque os governos não se pouparam a despezas avultadissimas e pessoas competentissimas se acharam á testa de similhante tentamen.

É vulgarissima a historia da acclimação das einchonas n'aquellas colonias; basta citar os nomes de Hasskarl, Markham, Spruce, Cross, Mae Ivor e August Vinson, hoje vinculados á historia das quinas e lembrar os pesadissimos saerificios feitos pela Hollanda e Inglaterra. Entre nós as cousas correram com menos apparato; vieram 100 plantas de Lisboa, escaparam 40, que foram entregues á inexperiencia dos lavradores e o resto á conta de Deus!! Pois valia bem a pena; era uma despeza remuneradora e nada inutil para a metropole.

A minha missão limitava-se a bem pouco:

1.º Ver o desenvolvimento que as einchonas tinham attingido;

2.º Ensinar praticamente os processos de exploração e os de cultura;

3.º Fazer comprehender os elevados lueros que poderão auferir aquelles que despenderem algum cuidado e tempo na cultura das quinas.

Comquanto tenham fructificado ha mais de cinco annos, contudo a propagação tem sido feita por mergulhia e estaca e não por sementes.

A sementeira na mão dos lavradores tem dado resultado negativo, e isto porque lançavam muita agua nos viveiros, em contrario do que se acha preceituado a este respeito; a semente n'estas circumstancias apodreec e não germina.

Corroborando esta asserção, vou apontar um facto, que não só prova a boa qualidade das sementes, mas tambem nos mostra que a acclimação das einchonas n'aquella ilha é um facto. Visitando a fazenda do sr. Jansenio Mello, no Paul mostraram-me uma plantinha de quina de 8 centimetros de altura, nascida sobre um grande penedo eoberto de linehen!! A semente fôra ali arrojada pelo vento ou levada por alguma ave, e com a quéda das chuvas germinou, porque o penedo não se enhareou; emquanto que nada existia no meio dos cafeseiros e quinas onde se dava a represa das aguas pluvias.

Distribui pelos lavradores alguns exemplares do folheto publicado em 1880 pelo ex.^{mo} sr. Julio A. Henriques sobre a cultura em questão; estou certo que com tão bom

guia os lavradores verão simplificados os estorvos que encontravam.

Nenhum interesse têm tirado os agricultores das suas quinas; ignoravam os processos de exploração e o commercio não os incitava pela offerta de um preço convidativo. Aconselhei a exploração seguida por Mac Ivor.

Começa-se desde o 5.^o anno a colheita da casca dos ramos e no 9.^o ou 10.^o anno o corte da arvore conforme o seu desenvolvimento. Um anno antes pratica-se uma incisão triangular que interesse toda a casca; ha desenvolvimento de vergonteas, e quando estas tiverem 3 ou 4 pés de altura, corta-se o tronco da arvore mãe.

Outro processo de Mac Ivor consiste em tirar ás arvores parte da casca e dispôr as cousas de modo que esta se regenere.

As difficuldades que na pratica se encontram em poupar o tecido gerador «o cambio», em ter pessoa adestrada para esta operação e podendo portanto resultar a morte da arvore, fazem com que seja preferivel o primeiro. É d'este parecer o sr. G. Ring.

A produção depende do consumo; productos irrealisaveis são fraco incitamento para o agricultor.

A falta de valor commercial produziu em Santo Antão o estacionamento da cultura das quinas.

Foi para remediar isto até certo ponto e tornar conhecido o producto, que em conselho de agricultura propuz:

- 1.^o Que se mandassem vir de Santo Antão amostras de casea de quina para serem analysadas;
- 2.^o Que o fornecimento para os hospitaes da provincia fosse d'aquella procedencia;
- 3.^o Que se devia preferir as sementes e plantas de quina de Santo Antão para a propagação d'esta cultura nas outras ilhas, estando como está garantida a qualidade.

ANALYSE

Foram recebidas, vindo acompanhadas de ramusculos com alguns paniculos fracturados e incompletos, provenientes do mesmo individuo vegetal, as caseas remettidas de Santo Antão que acabam de submeter-se a ensaios e o conveniente acondicionamento em que chegaram não deixou duvidar da sua inalteração durante o transporte. Do lado externo, mostram-se com uma côr cinzenta interrompida por manchas esbranquiçadas, derivadas na maior parte de lichens foliaceos dispersos na periphèria, com sulcos e proeminencias longitudinaes mais salientes n'umas do que em outras e com numerosas fendas transversaes em geral quasi circulares; a superficie interna é coroada de um vernello escuro. Appresentam-se enroladas longitudinalmente sobre o lado interno de um ou de ambos os bordos, formando tubos mais ou menos cylindricos de 25 a 30 centimetros de comprimento por 10 a 15 millimetros de diametro. Fracturadas transversalmente, formam superficies irregulares mais lisas no bordo externo e fibrosas no interno, medindo 2 millimetros de largura na maior parte das caseas, variando n'outras entre 1 e 3.

Quebram com facilidade em sentido longitudinal, deixando ver tres camadas perfeitamente distinctas em quasi todas.

A mais externa ou periderme é formada de um tecido compacto de cellulas bastante duras, difficilmente destacavel das subjacentes e n'umas caseas quasi adherentes ás fibras corticaes, n'outras bem separadas pela camada suberosa, é insípida, possuindo além d'estes todos os caracteres exteriores das caseas já mencionadas. A camada immediata ou envolvero suberoso é formada por tecido mais homogeneo e menos compacto que o do periderme, de cellulas facilmente destacaveis, menos volumosa nas caseas em que o liber é mais desenvolvido, tem uma côr parda-

centa, sabor amargo e um pouco estyptico. A tereceira ou liber é formado de tecido fibro-cellular mostrando por meio de um corte ou quebradura em qualquer sentido uma apparencia lenhosa, de fibras curtas e friaveis de um amarello alourado, envoltas por tecido cellular de côr avermelhada, mostrando numerosos pontos esbranquiçados, occupa as tres quartas partes, pouco mais ou menos, em espessura nas cascas de mais idade e tem sabor amargo.

Possuem as cascas um cheiro particuliar bem pronunciado e geralmente um peso consideravel; pulverisadas, dão um pó de aspecto um pouco fibroso, de côr amarella um tanto avermelhada, de sabor amargo levemente adstringente.

ENSAIOS CHIMICOS

I

Tendo-se tratado dez partes em peso do pó a que algumas das mais novas se reduziram completamente, por 100 pingos de agua distillada acidulada com 3 pingos de acido chlorhydrico, subjeitado a mistura á temperatura da ebulição durante 15 minutos e deixado repousar por espaço de 24 horas, separado o soluto por meio de um deslocador e esgotado a parte solida por quantidade sufficiente de agua acidulada do mesmo modo até que uma gota evaporada não deu residuo, addicionado á solução obtida depois de concentrada um pouco a quantidade bastante de outra de subacetato de chumbo sem lhe fazer perder a reacção acida, filtrado por papel liso e esgotado o precipitado com sufficiente quantidade de agua, juntado a todo o liquido pouco mais de 3,5 pingos de hydrato de potassa solvido em agua até quasi redissolver o precipitado e addicionado mais 60 pingos de ether sulphurico em vaso proprio, agitada bem a mistura e separado o ether por decantação depois de algum repouso, repetido este tratamento com mais 50 pingos de ether que se separou do mesmo modo e tendo-se finalmente reunido os dois solutos ethereos abandonando-os em seguida á evaporação espontanea, obteve-se um residuo levemente corado correspondente depois de secco a 0,10 pingos do pó empregado, verificando-se-lhe os seguintes caracteres: sabor amargo não muito saliente a principio tornando-se em seguida muito pronunciado e persistente: solveu-se quasi completamente em 35 pingos de agua n'uma temperatura um pouco elevada, possuindo esta solução a propriedade de levar ao azul o papel de tournesol conve-

nientemente avermelhado; evaporada esta solução a b. m. e tratado o residuo por iodo, deu uma materia escura que deveria corresponder á formula $2 \text{C}^{20} \text{H}^{24} \text{Az}^2 \text{O}^2, \text{I}^2$, por haver probabilidade de ser a mesma que se preeipita quando se trata um sal de quinina pelo iodureto de potassio iodurado (Naquet, *Propriedades da quinina*).

II

1.^a parte. Reduzindo-se mais uma porção de easeas completamente a pó e tendo-se tratado 20 grammas d'este por aleool a 76° centigrados, o suffieiente para formar pasta molle, tendo-se sujeitado á acção do calor por alguns minutos, juntando-se-lhe em seguida quantidade determinada de oxydo de caleio convenientemente hydratado misturando-se de modo a formar um todo quasi homogeneo, expondo-se a mistura a uma temperatura pouco elevada até se poder pulverisar, introduzindo-se o pó em-apparelho proprio para deslocar por ether sulphurico, empregando o suffieiente até que a evaporação de algumas gotas do soluto não deixou residuo, tendo-se enfim evaporado toda a solução etherea, encontrou-se um residuo um tanto corado que pesou 760 milligrammas, verificando-se-lhe, depois de manifestar os mesmos caracteres organolepticos e elimicos que o obtido no anteedente ensaio, mais o séguinte: uma pequena porção tratada por agua ehlorada e em seguida por ether e ammoniaco em pequeno excesso, deu uma côr esverdeada (reação caracteristica da quinina). Solvendo-se 500 milligrammas em pequena quantidade de aleool, tratando-se a solução por carvão animal e filtrando-se convenientemente, concentrando-a e separando se o deposito formado depois de algum tempo de repouso e repetindo esta ultima operação com o liquido restante, resultou uma materia quasi descorada ou quasi branea, pesando 467 milligrammas, tendo por conseguinte perdido 33 milligrammas, de onde se infere que todo o residuo bruto depois de purificado, isto é, os 760 milligrammas, fariam reduzidos a 710 milligrammas approximadamente. Não se pôde ver a acção que esta substancia assim purificada exerceria sobre a luz polarisada, por falta de instrumento proprio.

2.^a parte. A materia solida que restou no apparelho depois de deslocada por ether sulphurico (2.^o ensaio, 1.^a parte) foi tratada por alcool a 76° centigrados, o bastante, até que a evaporação de algumas gotas não deixou vestigio, e evaporada a solução até a completa seccura, ficou um

residuo que pesou 531 milligrammas, apresentando os seguintes caracteres: consideravelmente carregado de materia corante, sabor amargo, desenvolvendo-se mais lentamente que o extrahido da solução etherea (1.^a parte), parecendo por isto ser menos solúvel, mas tambem persistente; solvida convenientemente uma pequena quantidade, deu reacção alcalina sobre o papel de tournesol; aquecida uma pequena porção cautelosamente no fundo de um tubo de vidro fechado, sublimou-se em parte formando cristaes muy delicados e perfeitamente visiveis com o auxilio de uma lente (caracteres da cinchonina). Purificando-se 150 milligrammas por carvão animal, resultou uma materia quasi branca correspondente a 68 milligrammas; por consequencia os 531 milligrammas, isto é, o residuo extrahido da solução alcoolica depois de purificado, ficaria reduzido approximadamente a 240 milligrammas.

III

1.^a parte. Misturando-se mais 20 grammas do pó restante do 2.^o ensaio com 250 grammas de agua distillada acidulada com quantidade determinada de acido chlorhydrico e sujeitando-se a mistura á temperatura da ebulição por meia hora, separando-se o soluto e repetindo a mesma operação com uma nova quantidade de liquido, reunindo-se as soluções e evaporando-as até metade do seu volume, tendo-se-lhe juntado a pouco e pouco oxydo de calcio hydratado em pequeno excesso, separando-se em seguida o precipitado e seccando-se devidamente, reduzindo-se a pó e tratando este por ether sulphurico em apparelho proprio, resultou, pela evaporação da solução até a seccura, um producto menos carregado de materia corante que o obtido no 2.^o ensaio, 1.^a parte, pesando 729 milligrammas, tendo-se-lhe verificado os mesmos caracteres organolepticos e chimicos que apresentaram os residuos obtidos do 1.^o ensaio e na 1.^a parte do 2.^o, isto é, as propriedades caracteristicas da quinina. Depois da conveniente purificação em 500 milligrammas houve uma redução a 486 milligrammas; a mesma operação portanto em 729 milligrammas deixaria approximadamente em estado de pureza 709 milligrammas.

2.^a parte. Depois de se obter a solução etherea na antecedente 1.^a parte, o restante no apparelho deslocou-se por sufficiente quantidade de alcool a 86° centigrados, e da solução convenientemente evaporada até á seccura extra-

hiu-se um producto um pouco impuro que manifestou as mesmas propriedades que o obtido na 2.^a parte do 2.^o ensaio, pesando 352 milligrammas. Purificando-se 150 milligrammas d'este producto, ficou reduzido a 101 milligrammas; o todo, portanto, ficaria em 237 milligrammas depois de purificado.

IV

Tendo-se tratado mais uma porção de pó por aleool e hydrato de cal como no 2.^o ensaio, 1.^a parte, fazendo-se a deslocação só por aleool e depois de purificada a solução, tendo-se-lhe addicionado algumas gotas de acido sulphurico diluido, depositou-se, depois de alguma evaporação e seguido repouso, uma substancia crystallizada em pequenas agulhas, que depois de lavada convenientemente manifestou propriedades caracteristicas do sulphato de quinina.

De todos os productos obtidos nos anteeedentes ensaios possuem-se pequenos exemplares, isto é, pequenas porções de quinina bruta e purificada do segundo e terceiro, outras de cinchonina bruta e purificada dos mesmos, e uma pequena quantidade de sulphato de quinina d'este ultimo que foi simplesmente qualitativo; e omitindo-se a exposição de outros que se fizeram mais breves e apenas qualitativos, por se julgar não career de mais a demonstração da natureza e qualidade das caseas, e ficando assim exposta de um modo o mais simples e resumidamente possivel a descripção dos trabalhos feitos na referida analyse, vejam-se agora as dedueções e conclusão que d'ellas se póde tirar.

Dos caracteres organographicos observados nos ramusculos e panieulos que acompanharam as cascas e que se não descrevem pelo ponceo que adiantam, attento o fim que se tem em vista, colligiu-se com a preeceisa clareza que elles foram tirados de vegetaes do genero *cinchona* das Rubiaceas e portanto, tendo collido as cascas nos mesmos, deveriam ellas ser quinias ou pseudo-quinias. Não se tratou sequer de reconhecer a especie vegetal, não só porque as arvores d'onde se extrahiram as cascas pertencem a uma mesma especie por serem todas ainda das que em 1869 foram exportadas do jardim botanico da universidade de Coimbra para esta provincia, como pertencentes á *cinchona succirubra*, mas pela grande difficuldade que ha em determinar especies n'um genero muito natural e que comprehenda muitas, como a *cinchona* que abrange approximadamente trinta e seis, e tambem porque uma determinada es-

pecie vegetal e até um proprio individuo não produzem uma só especie de quina.

Por terem servido de preliminarés ensaios tambem ficam relatados alguns dos caracteres physicos e botanicos observados nas caseas, os que pareceram mais importantes, mas de que apenas se pôde tirar a probabilidade de serem ellas verdadeiras quinas, vindo em seguida dar d'isto a certeza o primeiro ensaio chimico; entretanto este, apesar de se ter repetido (ainda com o primeiro pó preparado de caseas mais novas), só poderá mostrar a natureza das caseas. Da comparação do seu resultado quantitativo com os resultados obtidos na primeira parte do segundo e terceiro, resulta uma consideravel differença, que deverá attribuir-se a serem as caseas que por elle se ensaiaram menos ricas em quinina, por terem sido colhidas de parte mais nova do vegetal (Weddel).

Tendo-se pois até aqui simplesmente averiguado serem as caseas verdadeiras quinas, só restava conhecer agora a sua qualidade, o que o 2.^o e 3.^o ensaios, não só vieram fazer, mas confirmar ainda o que d'ellas já se sabia, como tudo se pôde verificar na seguinte resumida exposição dos seus resultados:

2.^o ensaio

20 grammas de casea	{	Quinina imp.	760 milligrammas	
		» purif.	710	»
		Cinchonina imp. . .	531	»
		» purif. . .	240	»
100 grammas de casea	{	Quinina purif. . . .	3:550	»
		Cinchonina purif. . .	1:200	»

3.^o ensaio

20 grammas de casea	{	Quinina imp.	729 milligrammas	
		» purif.	709	»
		Cinchonina imp. . .	352	»
		» purif. . .	237	»
100 grammas de casea	{	Quinina purif.	3:545	»
		Cinchonina purif. . .	1:185	»

Se se tirar a media dos dois numeros que representam a percentagem de quinina n'estes dois ensaios, e a media

dos dois que representam a de chinchonina nos mesmos, resulta:

Quinina	3,5475	por 100	35,475	por 1:000
Cinchonina	1,1922	»	11,922	»
Alcaloides	4,7397	»	47,397	»

Como se vê são muito satisfactorios os precedentes resultados, sendo as caseas ensaiadas quinias de muito boa qualidade, não só por se apreeiarem geralmente assim as que manifestam mais de 3 por cento de alcaloides, mas também pelo que se poderá observar no que vai seguir-se.

Algumas quinias de S. Thomé, depois de tres analyses, (uma em 1877, outra em 1878 e outra em 1879) feitas em caseas de differente idade, pelo distincto chimico o sr. Joaquim dos Santos e Silva, no laboratorio chimico da universidade de Coimbra, e cujos resultados foram o maior 54,80 de alcaloides por 1:000, e os outros 43,45 e 42,47 de alcaloides também por 1:000, *estão muito competentemente julgadas como as de melhor qualidade*; comparando-se estes resultados com o ultimo que se obteve representante do valor em alcaloide (47,397 por 1:000), nota-se que este só é inferior a um d'aquelles.

Sabendo-se mais que em 100 de sulphato de quinina entram 74,31 de base (9,17 de acido e 16,51 de agua), as caseas ensaiadas poderão produzir 47 de sulphato de quinina por 1:000; e consultando o quadro de quinias commerciaes da quinologia de Delondre e Bouehardat, que se refere a trinta e tres especies, incluindo quinias de Perú, Bolivia, Nova Granada, Equador, etc., *encontra-se no grupo das de superior qualidade que a mais rica em quinina é a quina pitayo* (Nova Granada), que póde apenas produzir (analyse feita por Delondre) 40 de sulphato de quinina por 1:000; comparando agora este producto com o em cima das caseas ensaiadas (47 por 1:000 de sulphato), é clara a differença a favor d'estas.

Concluindo, pois, e attendendo ao que precedentemente fica exposto, deverão ser consideradas no commercio como as de melhor qualidade as quinias de Santo Antão, e possuindo a província de Cabo Verde, como é sabido, demasiados terrenos em boas condições climatericas para uma cultura avultadissima das arvores da quina, será uma das mais acertadas medidas para a sua prosperidade se se aumentar o numero de tão preciosas arvores com successi-

vas plantações, o que sem grande difficuldade se poderá realizar agora, visto haver já algumas de qualidade conhecida e perfeitamente desenvolvidas; o governo muito poderia concorrer para tornar bastante rica esta colonia com as plantas da quina, e os proprietarios de terrenos n'aquellas condições não encontrarão sem duvida cultura de maior rendimento.

Praia, 24 de janeiro de 1881. = *Eugenio Simões Diogo*.



